

Oznakowanie opakowania bezpośredniego, 800 g  
Lek do stosowania w recepturze aptecznej i w lecznictwie zamkniętym

2014 -05- 08  
SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
MERYTORYCZNYM

**JODYNA**  
*Iodi solutio spirituosa FP*  
Roztwór na skórę, 3%  
800 g

Lek odkażający.

Skład: jod 3 g  
jodek potasu, etanol (96%), woda oczyszczona do 100 g

Wskazania: dezynfekcja skóry przed zabiegami operacyjnymi i niewielkich uszkodzeń skóry.

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników leku.

Interakcje: brak.

Ostrzeżenia: nie stosować bezpośrednio na rany, chronić oczy. O stosowaniu w okresie ciąży, karmienia piersią i u niemowląt decyduje lekarz. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: brak wpływu.

Sposób stosowania: zewnętrznie, według zaleceń lekarza.

Działania niepożądane: miejscowe skórne odczyny alergiczne. Osoby wykonujące zawód medyczny powinny zgłaszać pojedyncze przypadki działań niepożądanych produktu leczniczego ze względu na konieczność nieprzerwanego monitorowania jego stosowania. Zgłoszenie należy przekazać podmiotowi odpowiedzialnemu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, [adres, nr telefonu, adres strony internetowej].

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przechowywać w temperaturze do 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek do stosowania w recepturze aptecznej i w lecznictwie zamkniętym.

Pozwolenie nr IL-4842/ChF

Nr serii:

Termin ważności:

Farmina sp. z o.o.  
ul. Lipska 44  
30-721 Kraków

[Logo]

[Kod kreskowy EAN UCC] 5909990627431

[Zapis w systemie Braille'a: Jodyna]