

CZOPKI GLICEROŁOWE

Glyceroli suppositoria

Czopki 2 g

5 czopków

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM

Skład: Glyceroli suppositoria z glicerolu 85%, kwasu stearynowego, bezwodnego węgla sodu.

Lek o działaniu przeczyszczającym

Wskazania: zaparcia.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, stany chorobowe odbyticy.

Interakcje: czopki glicerolowe mogą osłabiać działanie innych leków stosowanych doodbytniczo. Należy zachować kilkugodzinny odstęp.

Nie stosować u dzieci. Stosowanie u kobiet ciężarnych i karmiących należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania: doodbytniczo, dorośli 1-2 czopki. Lek należy stosować doraźnie w przypadku wystąpienia zaparc. Wypróżnienie powinno nastąpić w niedługim czasie po podaniu czopka (do około 1 godziny). Jeżeli dolegliwości nie ustąpią w ciągu kilku dni należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wątpliwości co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane: czopki glicerolowe są na ogół dobrze tolerowane. Możliwe jest wystąpienie podrażnienia odbyticy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku. Działania niepożądane można zgłaszać osobie wykonującej zawód medyczny, podmiotowi odpowiedzialnemu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [aktualny adres, nr telefonu i faksu, adres e-mail].

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Lek wydawany bez przepisu lekarza (OTC).

Pozwolenie nr IL-4586/LN

Nr serii:

Termin ważności:

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

[Logo]

[Kod kreskowy EAN UCC]: 5909990674039

lub

5909991107673

[Zapis w systemie Braille'a: Czopki glicerolowe 2 g]

CZOPKI GLICEROŁOWE

Glyceroli suppositoria

Czopki 2 g

10 czopków

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM

Skład: Glyceroli suppositoria z glicerolu 85%, kwasu stearynowego, bezwodnego węglańu sodu.

Lek o działaniu przeczyszczającym

Wskazania: zaparcia.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, stany chorobowe odbyticy.

Interakcje: czopki glicerolowe mogą osłabiać działanie innych leków stosowanych doodbytniczo. Należy zachować kilkugodzinny odstęp.

Nie stosować u dzieci. Stosowanie u kobiet ciężarnych i karmiących należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania: doodbytniczo, dorośli 1-2 czopki. Lek należy stosować doraźnie w przypadku wystąpienia zaparc. Wypróżnienie powinno nastąpić w niedługim czasie po podaniu czopka (do około 1 godziny). Jeżeli dolegliwości nie ustąpią w ciągu kilku dni należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wątpliwości co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane: czopki glicerolowe są na ogół dobrze tolerowane. Możliwe jest wystąpienie podrażnienia odbyticy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku. Działania niepożądane można zgłaszać osobie wykonującej zawód medyczny, podmiotowi odpowiedzialnemu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [aktualny adres, nr telefonu i faksu, adres e-mail].

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Lek wydawany bez przepisu lekarza (OTC).

Pozwolenie nr IL-4586/LN

Nr serii:

Termin ważności:

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

[Logo]

[Kod kreskowy EAN UCC]: 5909990673605

lub

5909991107680

[Zapis w systemie Braille'a: Czopki glicerolowe 2 g]

CZOPKI GLICEROŁOWE

Glyceroli suppositoria

Czopki 2 g

50 czopków

Skład: Glyceroli suppositoria z glicerolu 85%, kwasu stearynowego, bezwodnego węgla sodu.

Lek o działaniu przeczyszczającym

Wskazania: zaparcia.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, stany chorobowe odbytncy.

Interakcje: czopki glicerolowe mogą osłabiać działanie innych leków stosowanych doodbytniczo. Należy zachować kilkugodzinny odstęp.

Nie stosować u dzieci. Stosowanie u kobiet ciężarnych i karmiących należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania: doodbytniczo, dorośli 1-2 czopki. Lek należy stosować doraźnie w przypadku wystąpienia zaparc. Wypróżnienie powinno nastąpić w niedługim czasie po podaniu czopka (do około 1 godziny). Jeżeli dolegliwości nie ustąpią w ciągu kilku dni należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wątpliwości co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane: czopki glicerolowe są na ogół dobrze tolerowane. Możliwe jest wystąpienie podrażnienia odbytncy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku. Działania niepożądane można zgłaszać osobie wykonującej zawód medyczny, podmiotowi odpowiedzialnemu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [aktualny adres, nr telefonu i faksu, adres e-mail].

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Lek wydawany bez przepisu lekarza (OTC).

Pozwolenie nr IL-4586/LN

Nr serii:

Termin ważności:

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

[Logo]

[Kod kreskowyEAN UCC]: 5909990674046

lub 5909991107697

[Zapis w systemie Braille'a: Czopki glicerolowe 2 g]